



Syksyllä lakoontuneen, tukahduttavan heinän alta taimia voi pelastaa.

Heinäntorjunta

Viljavilla kasvupaikoilla pintakasvillisuus, kuten heinät, vadelma ja horsma, saattavat tukahduttaa kasvatettavia taimia. Jos pintakasvillisuuden kilpailu on kovaa, kasvatettavien taimien pituuskasvu taantuu. Heinän lakoontuminen voi peittää taimet kokonaan alleen ja tukahduttaa ne tai vaurioittaa taimia taivuttamalla niitä. Lisäksi runsas pintakasvillisuus altistaa taimet jyrsijätuhoille ja sienitaudeille. Riski on erityisen suuri talvisaikaan lumipeitteen alla.

Mekaanisessa heinäntorjunnassa pintakasvillisuutta poljetaan, taitetaan sivuun tai niitetään taimien ympäriltä vähintään pintakasvillisuuden korkeutta vastaavalta etäisyydeltä. Apuna voi käyttää pikkuviikatetta, raivausveistä, haravaa tai ruohoterällä varustettua raivaussahaa.

Torjunnan kannalta paras ajankohta on keskikesä, toisaalta taimet erottuvat parhaiten keväällä ja loppusyksystä. Ajankohtaa tärkeämpää on kuitenkin se, että työ yleensä tulee tehdyksi. Viljavilla mailla taimia tukahduttavaa heinää on torjuttava jo viljelykesänä.