

Huumekuolemat – ketkä kuolevat?


Päihdelääketieteen päivät 6.3.2020




Sanna Rönkä, VTT, erityisasiantuntija

Huumekuolemien kehitys


Huumekuolemien määrä nousussa vuodesta 2015 - kuolemia oli 2018 enemmän kuin koskaan aikaisemmin



Huumekuoolemien määrä on nyt kaksinkertaisella tasolla vuosituhanen vaihteeseen verrattuna –




Välittömät huumekuolemat kuolemansyiden mukaan



Lähde: Tilastokeskus

Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy




- Myrkytystapaturmat lähes yksinomaan huumemyrkytyksiä

Lähde: Tilastokeskus

Kun huumeet myötävaikuttavana syynä lasketaan mukaan – huumekuolemien määrä kolminkertaistuu


Kuolemantyyppi (Huumeisiin liittyvät kuolemat 1996-2007)	%
Välittömät huumekuolemat (myrkytykset ja huumeriippuvuudet)	36
Huumeisiin liittyvät onnettomuudet (pl. myrkytykset)	18
Huumeisiin liittyvät henkirikokset	3
Huumeisiin liittyvät sairaudet (pl. päihdehäiriöt)	21
Huumeisiin liittyvät itsemurhat (pl. myrkytykset)	19
Muut huumeisiin liittyvät kuolemat	3



Lähde: Rönkä ym. 2017


Ketkä kuolevat?

Huumemyrkytyskuolemien ikäryhmittäinen kehitys 2005-2018



Lähde: Oikeustoksikologia, THL

Välittömät huumekuolemat sukupuolen mukaan (%).



Lähde: Oikeustoksikologia, THL

”Bilekäyttäjien” kuolemat lisääntyneet monessa maassa – Suomessa tämä ei ole ilmiö

Reviews

Deaths related to MDMA (ecstasy/molly): Prevalence, root causes, and harm reduction interventions

Khary K. Rigg & Amanda Sharp

Pages 345-352 | Received 29 Nov 2017, Accepted 17 Jan 2018, Published online: 20 Feb 2018

Download citation

<https://doi.org/10.1080/14659891.2018.1436607>

Check for updates

Full Article

Figures & data

References

Citations

Metrics

Reprints & Permissions

Get access

ABSTRACT

Recent data show that MDMA (3,4 methylenedioxymethamphetamine) related deaths (MRDs) are on the rise in several countries. This rise in MRDs has caught the attention of public health officials and treatment practitioners. Although MDMA is not a new drug,

BBC

Sign in

News

Sport

Reel

Worklife

Travel

Future

M

NEWS

Home

Video

World

UK

Business

Tech

Science

Stories

Entertainment & Arts

Newsbeat

Ecstasy 'too child-friendly' as deaths rise to record levels

By Shiona McCallum
Newsbeat reporter

15 August 2019

f

✉

🐦

✉

Share



Huumekuolleisuus on yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen (1/2)

- Matala koulutus, työttömyys, eläkkeellä olo, avioero, leskeys ja asuminen laitoksessa tai yksin ovat yhteydessä huumekuolleisuuteen
- Erot olivat suuremmat kuin yleensä terveyserojen tutkimuksissa
- Huono-osaisuus oli huomattavinta kuolemissa, joissa peruskuolinsyynä päihdehäiriö -> pitkäaikaista jatkuvaa käyttöä

Rönkä, S., Karjalainen, K., Martikainen, P. T., & Mäkelä, P. (2017). Social determinants of drug-related mortality in a general population. *Drug and Alcohol Dependence*, 181, 37-43.

Huumekuolleisuus on yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen (2/2)

- Huono-osaisuus -> monien prosessien yhteenkietoutuma: Riskialttiimpaa käyttöä & haavoittuvuus (asunnottomuus, ongelmia toimeentulon ja virkavallan kanssa)
- Pelkkä peruskoulutus -> suuri riski, mutta toisen asteen ja korkea-asteen koulutetuilla ei eroa -> Huumekuolemaan johtava syrjäytymisprosessi alkaa nuorella iällä
- Eläkkeellä olevilla oli korkein riski huumekuolemaan
 - Todennäköisesti kyse on työkyvyttömyyseläkkeellä olevista

Rönkä, S., Karjalainen, K., Martikainen, P. T., & Mäkelä, P. (2017). Social determinants of drug-related mortality in a general population. *Drug and Alcohol Dependence*, 181, 37-43.

Vielä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista

- Erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla huumeita ongelmallisesti käyttävillä oli PKV-reseptilääkeostoksia huume yliannostuskuolemiin liittyen
- On mahdollista että lääkityksellä on hoidettu muuta mielenterveyden häiriötä tai huumeongelma on jäänyt tunnistamatta terveydenhuollossa.

Rönkä, S., Karjalainen, K., Vuori, E., & Mäkelä, P. (2015). Personally prescribed psychoactive drugs in overdose deaths among drug abusers: A retrospective register study. *Drug and Alcohol Review*, 34(1), 82–89.

Julkaistu tänään Duodecim-lehden verkkosivuilla



ALKUPERÄISTUTKIMUS 

Sanna Rönkä, Jukka Ollgren, Hannu Alho, Henrikki Brummer-Korvenkontio,
Teemu Gunnar, Karoliina Karjalainen, Airi Partanen ja Tiina Väre

Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa vuonna 2017

Huumeiden ongelmakäytön yleisyys

- Suomessa arvioitiin olleen 31 100–44 300 amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävää vuonna 2017 (0,9–1,3 % 15–64- vuotiaista suomalaisista)
- Noin puolitoistakertaa enemmän kuin vuonna 2012
- Yleisintä ongelmakäyttö oli 25–34-vuotiaiden (1,1–2,8 %) ja miesten (1,3–1,7 %) joukossa sekä Etelä-Suomessa (1,0–1,9 %)
- 15–24-vuotiaiden huumeita ongelmallisesti käyttävien määrä on lisääntynyt - ja lähentynyt sekä 25–34-vuotiaiden että 35–44-vuotiaiden ongelmakäyttäjien määrää

Kiitos!

sanna.ronka@thl.fi