

IMPORTANT MEDICAL INFO



**THIS PATIENT LACKS PARATHYROID HORMONE
AND IS AT RISK FOR HYPOCALCEMIC AND
HYPERCALCEMIC CRISES.**

In case of serious illness, nausea, vomiting and/or cramps, check serum calcium and kidney function.

If hypocalcemia and tetany, administer i.v. 2.5-5 mmol calcium chloride or gluconate (~ 100-200 mg elemental calcium) in 100 mL saline or glucose solution over 10 min. Repeat if needed.

If hypercalcemia > 3.5 mmol/L (14.0 mg/dL), administer saline intravenously and admit the patient immediately to hospital.

Name/Nimi

Date of birth/ Syntymäaika



European Society
of Endocrinology

OHJE LÄÄKETIETEELLISEEN HÄTÄTILANTEESEEN



LISÄKILPIRAUHASHORMONIN PUUTTEEN VUOKSI POTILAALLE VOI KEHITTYÄ MATALAN TAI KORKEAN KALSIUMIN AIHEUTTAMA HÄTÄTILANNE.

Tarkista plasman kalsium ja munuaisten toiminta, jos potilas on vakavasti sairas, pahoinvoiva ja/tai hänen lihaksissaan on kouristelua.

Anna hypokalseemisen tetanian ensihoidoksi 10 ml Calciumgluconat B. Braun 100 mg/ml injektioestettä (93 mg elementaarista kalsiumia)/100ml NaCl 0,9% suoneen 10 minuutin aikana. Tarvittaessa toista ja aloita jatkuva kalsiuminfuusio.

Aloita hyperkalseemian (P-Ca >3,5mmol/l) ensihoidoksi NaCl 0,9%-infuusio ja ota potilas sairaalaseurantaan.

