

OSTEOPOROOSI HAASTEENA

Yli kolmasosa postmenopausaalisista naisista saa osteoporoottisen murtuman loppuelämänsä aikana. Luustontiheyteen vaikuttaa perinnöllisten syiden lisäksi tupakointi, liikuntatottumukset, D-vitamiinin saanti tai käytetyt lääkehoidot, kuten syöpälääkkeet ja kortikosteroidit. Hoidon aloittaminen saattaa viivästyä ja osteoporoosin lääkehoidon komplikaationa syntynyt leukaluun osteonekroosi tai epätyypillinen lonkkamurtuma voivat estää lääkkeen jatkamisen. Tule kuuntelemaan tärpit osteoporoosin tunnistamiseen ja hoitoon.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: endokrinologia, fysiatria, geriatria, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, liikuntalääketiede, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, ortopedia ja traumatologia, reumatologia, sisätaudit/runkokoulutus, syöpätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, 1 tunti: akuuttilääketiede

Puheenjohtaja dosentti SAARA METSO, Tays

- 9.20** LT ANNA-MARI KOSKI, Keski-Suomen Sairaala Nova
Diagnostiikka ja riskipotilaan tunnistaminen
- 9.50** LT LASSI NELIMARKKA, TYKS
Kortisonihoitoon ja syöpälääkkeisiin liittyvä osteoporoosi
- 10.15** TAUKO (25 min)
- 10.40** Erikoislääkäri ANTTI JOKINIITTY, Tays
Mitä osteoporoosilääkkeen aiheuttaman komplikaation jälkeen
- 11.05** LT ANNE HIUKKA, Tays
Hyötykö iäkäs potilaani osteoporoosin hoidosta
- 11.30** Erikoislääkäri HELENA PORKKALA, Tays Hatanpää
Lonkkamurtumapotilaan osteoporoosin hoito – potilastapauksia
- 12.00** Ohjelma päättyy