

### Klassinen ehlers-danlosin oireyhtymä (cEds)

Tämän kortin haltijalla on klassinen Ehlers-Danlosin oireyhtymä (cEDS)

Hänen **ihonsa** on hauras ja vaurioituu myös pienestä ulkoisesta ärsykkeestä erittäin herkästi ja laajalta alueelta. Hän saattaa saada laaja-alaisia mustelmia, haavat paranevat hitaasti, ovat hankalia ommella, ja arpeutumisen on poikkeavaa. **Nivelet** ovat kipeitä sekä yliliikkuvia ja ne menevät helposti joko osittain tai kokonaan paikoiltaan. **Verisuonet** ovat hauraita. Hänellä saattaa esiintyä verenvuotoja spontaanisti tai ulkoisen trauman aiheuttamana.

**Kudokset** ovat hauraita ja venyviä. Tämä saattaa aiheuttaa tyriä, lantionpohjan prolapseja sekä kohdunkaulan heikkoutta raskauden aikana. Henkilöllä saattaa olla sydänlappävika.

Käännä ▶

- Haavojen ompelu suositellaan plastiikkakirurgin tai muun erikoislääkärin tehtäväksi.
- Ompeleet saavat olla paikallaan normaalia pidempään ja haavalaastarin tai muun haavaa tukevan sidoksen käyttö on suositeltavaa.
- Paikallispuudutteen teho on usein riittämätön tai lyhytaikainen.
- Intuboidessa tulee leuka avata varoen, jottei se mene sijoiltaan.
- Varmista sydämen läppien kunto ultraäänien avulla.
- Äidillä on normaalia korkeampi riski saada synnytyksessä sidekudosvaurioita, joten kättilöiden ja synnytystä hoitavien lääkäreiden on hyvä olla tietoisia diagnoosista.
- Käsittele henkilöä varoen välttääksesi yliliikkuvien nivelten ja sidekudoksen vaurioita.