

### Vaskulaarinen Ehlers-Danlosin oireyhtymä (vEDS)

Tämän kortin haltijalla on vaskulaarinen Ehlers-Danlosin oireyhtymä (vEDS).

Tämä on **henkeä uhkaava sairaus**, joka aiheuttaa verisuonten, sisäelinten, ihon ja muiden kudosten haurautta. Tajunnan menetys tai voimakas kipu vatsan, rinnan tai lantion alueella saattaa olla merkki valtimon tai sisäelimen repeämisestä. Henkilö saattaa olla myös sekava. Silmäkipu, silmien punoitus ja sykkeen tuntu silmissä saattaa johtua silmäntakaisesta valtimo-laskimofistelistä.

**Mikä tahansa edellä mainituista oireista vaatii välitöntä lääkärin tutkimusta.**

## ICE • HOITO-OHJE • ICE

- Invasiivisia hoitotoimenpiteitä tulee välttää aina, kun se on mahdollista.
- Oireiden aiheuttaja tulee selvittää välittömästi magneettitutkimuksen tai TT-kuvauksen avulla.
- Vältä ihon, elinten ja verisuonien venyttämistä tutkimusten ja leikkausten aikana.
- Vältä lihakseen annettavien injektoiden ja peräruiskeiden antamista sekä angiografian ja endoskopioiden tekemistä.
- Vältä hepariinia sekä muuta veritulppia ehkäisevää lääkitystä.
- Keskuslaskimo- ja valtimokatetri tulee asentaa ultraääniohjauksessa.
- Verenvuoto tulee hoitaa konservatiivisesti verensiirtoja sekä suonensisäistä nesteytystä käyttäen.
- Anna yleisanestesia varoen vammojen välttämiseksi.
- Käsittele henkilöä varoen välttääksesi aiheuttamasta mustelmia sekä yliliikkuvien nivelten vaurioita.
- Kirurgisessa toimenpiteessä pitäisi olla verisuonikirurgi mukana toimenpiteen erikoisalasta riippumatta.