

Lääkeaine:	Keskeiset riskit ja huomioitavat asiat:	Seuraukset:	Riskipotilaat ja riskisairaudet	Kysy / kerro
<b>Asetyylisalisyylihappo (ASA): kipulääke- ja yhdistelmävalmisteet (≥ 300 mg)</b>  (Aspirin, Disperin, Treo, Finrexin)  <b>Asetyylisalisyylihappo (ASA): mini-ASA (50-250 mg)</b> (ASA-ratiopharm, Aspirin Cardio, Disperin, Primaspan, Trombo ASA)	<b>Keskeiset riskit:</b> ◦ Yhteiskäyttö muiden veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden kanssa → verenvuodot		<b>Riskipotilaat:</b> ◦ Iäkkäät (> 65 v) ◦ Lapset (< 16 v) ◦ Raskaana olevat (erityisesti alku- ja loppuraskaus)	<b>Kysy:</b> ◦ Kenelle lääke tulee? ◦ Onko kroonisia sairauksia tai säännöllistä lääkitystä? (Eryisesti munuaiset, verenohennuslääkkeet, astma) ◦ Onko lääkeallergioita? ◦ Onko ollut mahahaavaa tai muita ruoansulatuskanavan verenvuotoja? Närästääkö usein? <b>mini-ASA:</b> ◦ Onko hoito lääkärin määräämä? <b>Kerro:</b> ◦ Kahta tulehduskipulääkettä ei saa käyttää samanaikaisesti. ◦ ASAa ei suositella lasten kipu- ja kuumelääkkeeksi. ◦ Mini-ASA annosteltava 2 h ennen muita tulehduskipulääkkeitä (jos yhtäaikainen käyttö on välttämätöntä).
	◦ Yhteiskäyttö verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (muut tulehduskipulääkkeet, kortikosteroidit, SSRI- ja SNRI-lääkkeet) → GI-kanavan verenvuodot			
	◦ ASAn käyttö ennen tai jälkeen kirurgisten toimenpiteiden (myös hammaspoistot) → verenvuodot		◦ Sydän- ja verisuonisairaudet ◦ Tulehdukselliset suolistosairaudet ◦ Kardiovaskulaariset / sydäninfarktin riskitekijät (verenpaine, kolesteroli, diabetes, tupakointi) ( <b>ASA ≥ 300 mg</b> ) ◦ Astma (10-20 % astmaatikoista yliherkkiä) ◦ Kihti	
	◦ Mini-ASAn tautus ennen toimenpiteitä ja aloitus toimenpiteen jälkeen (selvitettävä aina lääkärin kanssa) → verenvuodot, tukokset			
	<b>Muuta huomioitavaa:</b>			
	◦ Interaktiot verenpaine- ja sydämen vajaatoiminnan lääkkeiden kanssa → muun lääkkeen tehon heikentyminen			
	◦ Interaktio litiumin kanssa → litiumin tehon lisääntyminen			
◦ Allergiset reaktiot ja yliherkyys (mm. astmaatikot) → Hengenahdistus				
◦ Ei tule käyttää lapsilla virusinfektioissa → Reyen syndrooman riskin lisääntyminen				
<b>Ibuprofeini</b> (Burana, Ibumax, Ibxin, Ibutabs, Ibumetin)  <b>Ketoprofeini</b> (Ketorin, Ketomex)  <b>Naprokseeni</b> (Pronaxen)	<b>Keskeiset riskit:</b> ◦ Yhteiskäyttö veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden kanssa → verenvuodot		<b>Riskipotilaat</b> ◦ Iäkkäät (> 65 v) ◦ Raskaana olevat (erityisesti alku- ja loppuraskaus)	<b>Kysy:</b> ◦ Kenelle lääke tulee? ◦ Onko kroonisia sairauksia tai säännöllistä lääkitystä? (Eryisesti munuaiset, verenohennuslääkkeet, astma) ◦ Onko lääkeallergioita? ◦ Onko ollut mahahaavaa tai muita ruoansulatuskanavan verenvuotoja? Närästääkö usein? <b>Kerro:</b> ◦ Ibuprofeeni on tulehduskipulääkkeistä suositeltavin. ◦ Kahta tulehduskipulääkettä ei saa käyttää samanaikaisesti. ◦ Lasten annosohje ja nestemäisen valmisteen mittaushoje. ◦ Mini-ASA annosteltava 2 h ennen.
	◦ Yhteiskäyttö verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (muut tulehduskipulääkkeet, mini-ASA, kortikosteroidit, SSRI- ja SNRI-lääkkeet) → GI-kanavan verenvuodot			
	<b>Muuta huomioitavaa:</b>		◦ Sydän- ja verisuonisairaudet ◦ Tulehdukselliset suolistosairaudet ◦ Kardiovaskulaariset / sydäninfarktin riskitekijät (verenpaine, kolesteroli, diabetes, tupakointi) ◦ Astma (10-20 % astmaatikoista)	
	◦ Interaktiot verenpaine- ja sydämen vajaatoiminnan lääkkeiden kanssa → Muun lääkkeen tehon heikentyminen			
	◦ Interaktio litiumin kanssa → litiumin tehon lisääntyminen			
◦ Allergiset reaktiot ja yliherkyys (mm. astmaatikot) → Hengenahdistus				

Lääkeaine:	Keskeiset riskit ja huomioitavat asiat:	Seuraukset:	Riskipotilaat ja riskisairaudet	Kysy / kerro
<b>Parasetamoli</b> (Panadol, Paramax, Pamol, Rolod)	<b>Keskeiset riskit:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Yliannostus</li> <li>◦ Useiden valmisteiden samanaikainen käyttö</li> <li>◦ Alkoholin runsas käyttö</li> </ul>	→ Maksatoksisuus	<b>Riskipotilaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alkoholistit</li> </ul> <b>Riskisairaudet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Krooninen kipu (useiden kipulääkkeiden samanaikainen käyttö)</li> <li>◦ Epilepsia</li> </ul>	<b>Kysy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kenelle lääke tulee?</li> <li>◦ Onko kroonisia sairauksia tai säännöllistä lääkitystä?</li> </ul> <b>Kerro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää.</li> <li>◦ Ei sovi yhteen alkoholin kanssa.</li> <li>◦ Lasten annosohje ja nestemäisen valmisteiden mittausohje.</li> </ul>
	<b>Muuta huomioitavaa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Yhteiskäyttö varfariinin kanssa (annos &gt; 2 g/vrk)</li> </ul>	→ Verenvuodot		
	<b>Muuta huomioitavaa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Interaktio epilepsialääkkeiden kanssa</li> </ul>	→ Maksatoksisuus		
<b>Kaliumkloridi</b> (Kaleorid, Miral)	<b>Keskeiset riskit:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vaikea munuaisten vajaatoiminta</li> <li>◦ Yhteiskäyttö kaliumia säästävien diureettien kanssa</li> </ul>	Hyperkalemia (sydämen rytmihäiriöt, neuro-muskulaariset oireet)	<b>Riskipotilaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Iäkkäät (&gt; 65 v)</li> </ul> <b>Riskisairaudet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Munuaisten vajaatoiminta</li> <li>◦ Sydänsairaudet</li> <li>◦ Diabetes</li> <li>◦ Ruokatorven ahtaumat ja kuroumat</li> </ul>	<b>Kysy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kenelle lääke tulee?</li> <li>◦ Onko hoito lääkärin määräämä?</li> <li>◦ Onko kroonisia sairauksia tai säännöllistä lääkitystä?</li> </ul> <b>Kerro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nieltävä kokonaisuina, aterian yhteydessä tai runsaan nesteen kera. Vältettävä ottamista juuri ennen nukkumaanmenoa.</li> <li>◦ Säännöllinen veren kaliumpitoisuuden seuranta tärkeää.</li> </ul>
	<b>Muuta huomioitavaa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Limakalvoja ärsyttävä</li> </ul>	→ Limakalvovauriot		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Yhteiskäyttö ACE-estäjien ja ATR-salpaajien kanssa, jos munuaissairaus</li> </ul>	→ Lievä hyperkalemia		

**Lähteet:**

- Käypä hoito - suositukset: Itselääkitys, Kipu, Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö
- SFINX
- Valmisteyhteenvedot