

VIERASLAJIT HEIKENTÄVÄT LUONNON MONIMUOTOISUUTTA



Vieraslajit ovat kasveja, eläimiä tai muita eliölajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisten levinneisyysalueidensa ulkopuolelle ihmisen toiminnan seurauksena. Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä syrjäyttämällä alkuperäislajistoa. Esimerkiksi lupiini on monin paikoin vallannut tienpientareet ja hävittänyt niittykasvit tieltään. Elinympäristön häviämisen ja pirstoutumisen ohella haitalliset vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti merkittävä luonnon monimuotoisuutta uhkaava tekijä.

UUDET LAJIT VALTAAVAT VESIÄMME

Isosorsimo on korkea heinäkasvi, joka leviää nopeasti ja muodostaa tiheitä kasvustoja, jotka tukahduttavat alkuperäisiä kasvilajeja. Sitä voi torjua niittämällä useita kertoja kasvukauden aikana tai peittämällä pienialainen kasvusto valoa läpäisemättömillä pressuilla. Isojen kasvustojen poisto vaatii ruoppaus- tai kaivinkonekalustoa.

Kanadanvesirutto leviää helposti ja voi muodostaa tiheitä mattoja, jotka haittaavat kaikkea vesillä liikumista. Se muuttaa vesistöjen ravinnekiertoa ja vaikuttaa myös veden laatuun. Sitä voi torjua raivausnuottauksella, keräävällä niittokoneella tai pienimuotoisesti vaikka haravalla. Huolellinen jätteen kerääminen talteen on tärkeää, sillä vesirutto leviää tehokkaasti pienistäkin kasvin palasista.



Isosorsimo kasvattaa nopeasti laajoja ja tiheitä kasvustoja rannoille.



Kanadanvesirutto muodostaa tiheitä kasvustoja vesistöihin.

Minkki ja supikoira ovat vieraspetoja, jotka verottavat vesistöjen rantojen lintukantoja ja vaikuttavat haitallisesti alkuperäisluonnon monimuotoisuuteen. Erityisesti herkät saaristo- ja kosteikkoalueet ovat alttiita supikoiran ja minkin saalistusvaikutukselle, mikä heikentää varsinkin linnuston ja sammakkoeläinten monimuotoisuutta.

Vieraspetojen pyynti kannattaa tehostaa huippuunsa ennen kevään pesimäkautta. Kukkian suojeluyhdistys on hankkinut lainattavaksi loukkuja ja luonut paikallisten metsästäjien kanssa Kukkian ympärille verkoston, jolta saa ohjeita ja apua vieraspetopyyntiin. Yhteyshenkilöiden puhelinnumerot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta ja loukkuja voi kysyä lainaan osoitteesta info@kukkiansuojeluyhdistys.fi.



Minkki on keskikokoinen näätäeläin, jolla on mustanruskea turkki ja valkea leukalaikku.



Supikoiralla on melko lyhyet raajat, pyöreäpäiset pienehköt korvat ja pitkä, tuuhea mustan-, ruskean-, harmaan- ja valkoisenkirjava turkki

Hyytelösammaleläin on makean veden sammaleläinten yhdyskunta, joka muodostaa hyytelömäisiä, limaisia möykkyjä. Ne voivat kiinnittyä vesikasveihin, laitureihin tai kellua vapaasti vedessä. Runsaana esiintyessään se voi vaikuttaa järvien ekosysteemiin. Sen leviämistä voi hillitä nostamalla möykyt vedestä ja kompostoimalla tai hautaamalla ne maahan. Veneiden ja kalastusvälineiden huolellinen puhdistaminen ennen siirtoa järvestä toiseen on tärkeää. Kukkialta ei ole vielä tehty siitä havaintoja, vaikka sitä lähivesillä onkin.



Hyytelösammaleläin voi muodostaa isojakin limaisia möykkyjä.

Tärkein keino haitallisten vieraslajien torjumiseksi on estää niiden pääsy uusille alueille. Varhainen havaitseminen ja nopea reagointi niiden leviämisen estämiseksi on tärkeää. Vieraslajien torjunta vaatii usein sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä, mutta voi tarjota myös merkityksellistä yhdessä tekemistä vaikka niittotalkoiden muodossa.

Vieraslajit.fi kertoo vieraslajeista Suomessa

Kansallinen vieraslajisivusto vieraslajit.fi kokoaa suomalaisen vieraslajitiedon yhdelle sivustolle. Vieraslajit.fi auttaa tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja sekä keräämään niistä havaintoja mm. lajien seurantaan ja tutkimusta varten. Sivustolla on myös tietoa vieraslajien torjuntaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä hallintasuunnitelmista.

